

お詫びと訂正

「日本臨床内科医会誌 第 39 巻第 2 号」に下記の誤りがありました。正しくは、下記の通りとなります。訂正して、お詫び申し上げます。

p.127 表 1 新型コロナワクチン定期接種（65 歳以上または 60 歳～ 64 歳で重大な基礎疾患のある方）

下記の表にさしかえてください。二重下線部が訂正箇所となります。

表 1 新型コロナワクチン定期接種（65 歳以上または 60 歳～ 64 歳で重大な基礎疾患のある方）

ワクチン名	コミナティ	スパイクバックス	ダイチロナ	ヌバキンビッド	コストアイベ
会社	ファイザー	モデルナ・ジャパン	第一三共	武田薬品工業	Meiji Seika ファルマ
種類	mRNA	mRNA	mRNA	組換えタンパク	mRNA
1 回筋注量	希釈なし 0.3m/	希釈なし 0.5m/	希釈なし 0.6m/	希釈なし 0.5m/	希釈 0.5m/ (生食で溶解)
包装	10 回分 / 10 シリンジ / 箱	5 回分 / 1 バイアル / 箱※	4 回分 / 2 バイアル / 箱	<u>2</u> 回分 / 1 バイアル / 箱	16 回分 / 1 バイアル / 箱
保存	2～8℃で 8 ヶ月	解凍後 2～8℃で 30 日※	2～8℃で 7 ヶ月	2～8℃で <u>9</u> ヶ月	2～8℃で 1 ヶ月
接種時	<u>(紫外線を避け) 室温で</u> <u>12</u> 時間以内	遮光室温で 12 時間以内	遮光室温で 12 時間以内	遮光室温で <u>24</u> 時間以内	遮光室温で 6 時間以内
対象年齢	12 歳以上(6 ヶ月～)	12 歳以上(6 ヶ月～)	12 歳以上	12 歳以上(6 歳～)	18 歳以上
参考	シリンジタイプで簡便、誤接種が減る？	※シリンジに変更予定？	国産	不活化ワクチン、副反応が低下するかも？	レプリカーゼのコードを含み効果持続が長い？

(2024.9.10 現在)